
Fernanda Pereira Fanti¹,
Claudia Tatiana Araujo
da Cruz-Silva²,
Kátia Christina Zuffellato-Ribas³

**PROPAGAÇÃO VEGETATIVA DE
JASMIM-AMARELO (*JASMINUM MESNYI*
HANCE) VIA ESTAQUIA**

RESUMO: O jasmim-amarelo (*Jasminum mesnyi* Hance), pertencente à família Oleaceae, é um arbusto semi-herbáceo, cujas flores, amarelas e perfumadas, aparecem em abundância na primavera. Em razão do potencial ornamental da espécie, este trabalho objetivou avaliar a melhor concentração de ácido indolbutírico (AIB) para a indução do enraizamento de estacas herbáceas de jasmim-amarelo. As estacas foram confeccionadas com 5 cm de comprimento e 2 folhas apicais, sendo desinfestadas numa solução de hipoclorito de sódio (0,5%) por 15 minutos. Na base das estacas foi aplicado AIB na forma de talco nas concentrações de 0, 1000 e 2000 mg Kg⁻¹. As estacas foram plantadas em tubetes contendo vermiculita de granulometria média e acondicionadas em casa de vegetação (24 ± 2°C, UR= 90%), no verão. Após 48 dias, constatou-se que houve um elevado número de estacas enraizadas (90 a 95,7%). Para o comprimento das raízes por estaca, os tratamentos com AIB estimularam o crescimento das raízes diferindo estatisticamente do tratamento controle. Conclui-se que o jasmim-amarelo é uma espécie que apresenta uma elevada capacidade de enraizamento, com taxas acima de 90%, podendo ser considerada de fácil enraizamento.

PALAVRAS-CHAVE: espécie ornamental; auxina; enraizamento; AIB.

Data de submissão: 03-07-2013

Data de Aceite: 21-01-2014

¹ Bióloga, Mestre em Botânica – Universidade Federal do Paraná.

² Bióloga; Doutoranda em Engenharia Agrícola – Universidade Estadual do Oeste do Paraná. PGEAGRI, CCET, Campus de Cascavel, Unioeste, Cascavel-Paraná - claudia_petsmart@hotmail.com.

³ Bióloga, Professora Doutora em Botânica da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

VEGETATIVE PROPAGATION OF YELLOW JASMINE (*Jasminum mesnyi* Hance) BY CUTTING

ABSTRACT: The yellow jasmine (*Jasminum mesnyi* Hance), belonging to the family Oleaceae, is a semi-herbaceous shrub, with yellow and very fragrant flowers that appear in abundance during spring. Because of the ornamental potential of the yellow jasmine this study aimed to evaluate the optimal concentration of indole butyric acid (IBA) to induce rooting of softwood cuttings. The cuttings made were 5 cm long and with 2 apical leaves, and disinfected in a solution of sodium hypochlorite (0.5%) for 15 minutes. On the bases of the cuttings, it was applied IBA in the form of powder, in concentrations 0, 1000 and 2000 mgKg⁻¹. The cuttings were planted in conical polyethylene container with vermiculite of medium granulometry and placed in a greenhouse (24 ± 2°C, RH = 90%), during summer. After 48 days, it was found that there was a high number of rooted cuttings (90 to 95.7%). About the length of roots per cutting, treatments with IBA stimulated root growth, and were significantly different than control treatment samples. It was conclude that the yellow jasmine is a species that has a high rooting capacity, with rates above 90% and can be considered of easily rooting.

KEYWORDS: ornamental plant, auxin, rooting, IBA.

INTRODUÇÃO

O jasmim-amarelo (*Jasminum mesnyi* Hance), pertencente à família Oleaceae, é um arbusto de estrutura semi-herbácea originário da China. Apresenta caráter escandente com caules finos, muito flexíveis e densamente ramificados. As flores aparecem em abundância na primavera, mas se fazem presentes o ano todo, são amarelas e podem ser singelas ou dobradas, bastante perfumadas. Na antiguidade, suas flores eram utilizadas no Japão para aromatizar o chá preto. Na atualidade, a planta é mais utilizada como cerca-viva, cultivada de preferência em locais altos para permitir a formação pendente da ramagem, não sendo, portanto, conduzida como trepadeira (LORENZI; SOUZA, 1999).

A reprodução dessa espécie se dá principalmente por meio da estaquia caular (LORENZI; SOUZA, 1999), tipo de propagação que vem sendo largamente utilizada, uma vez que a planta originada desse processo mantém as características selecionadas das plantas parentais (ONO; RODRIGUES; PINHO, 1994). Segundo Hartmann *et al.* (2011), a propagação por estacas é a mais importante forma de clonagem de plantas, sejam elas ornamentais ou frutíferas. A propagação vegetativa pode proporcionar a formação de grande quantidade de mudas de boa

qualidade em curto espaço de tempo (FONSECA *et al.*, 1991).

Quando uma planta é considerada relativamente difícil de enraizar, pode-se tentar reverter esse obstáculo empregando reguladores vegetais, especificamente do grupo das auxinas, que, além de estimularem e acelerarem o enraizamento das estacas, uniformizam a formação de raízes (ONO *et al.*, 1994), com consequente diminuição da permanência das estacas no leito de enraizamento (ONO; RODRIGUES; PINHO, 1994; ANDRADE; MARTINS, 2003).

As principais auxinas utilizadas para a indução do enraizamento são o ácido naftaleno acético (ANA) e o ácido indolbutírico (AIB), sendo o AIB mais utilizado por possuir alta atividade (NASS *et al.*, 2001; ONO; RODRIGUES; PINHO, 1998). Tais auxinas podem ser empregadas na forma de talco, na forma de solução aquosa ou dissolvidas em solventes orgânicos como o álcool. Seu uso na forma de talco representa maior facilidade e praticidade para o produtor, sendo também de menor custo (ONO *et al.*, 1994).

Zuffellato-Ribas e Rodrigues (2001) confirmam essa informação dizendo que em numerosas plantas o enraizamento é grandemente aumentado pela adição de auxinas sintéticas, sendo o regulador vegetal de maior sucesso o AIB, por ser uma substância mais estável, menos solúvel que o AIA (ácido indol acético), considerado um dos melhores estimuladores de enraizamento. Segundo Jarvis, Ali e Shaheed (1983), para se obter o máximo do efeito da auxina, esta deve ser fornecida em altas concentrações exógenas. O AIB apresenta como vantagens a baixa toxicidade, ação mais localizada do que os outros produtos e maior estabilidade química no corpo da estaca (STUMPF; GROLLI; SCZEPANSKI, 2001).

Apesar da grande utilização ornamental do jasmim-amarelo, há pouca informação sobre a produção de mudas dessa espécie. Dessa forma, este trabalho objetivou verificar a promoção do enraizamento em estacas caulinares de *Jasminum mesnyi* Hance sob a influência da aplicação de ácido indolbutírico (AIB) em diferentes concentrações.

MATERIAL E MÉTODOS

O presente trabalho foi conduzido em casa de vegetação climatizada (24 ± 2 °C, com nebulização intermitente e umidade relativa (UR) do ar em torno de 90%), localizada no Centro Politécnico, Setor de Ciências Biológicas, da Universidade Federal do Paraná (UFPR), em Curitiba, Paraná.

Para obtenção das estacas, foram coletados ramos herbáceos de jasmim-amarelo (*Jasminum mesnyi* Hance) nas primeiras horas da manhã, no verão, nos jardins do Centro Politécnico. Os ramos coletados foram acondicionados em saco plástico e transportados até o Departamento de Botânica.

As estacas foram confeccionadas com corte basal em bisel e corte reto a 1 cm da última gema apical, mantendo-as com um comprimento de aproximadamente 5 cm, sendo deixadas duas folhas na porção apical. Em seguida, as estacas foram desinfestadas com solução de hipoclorito de sódio a 0,5% por 15 minutos, sendo posteriormente lavadas em água corrente por 5 minutos para posterior tratamento com o regulador vegetal.

Utilizou-se ácido indolbutírico (AIB) na forma de talco em diferentes concentrações: 0, 1000 e 2000 mg Kg⁻¹.

As estacas foram plantadas em tubetes levemente cônicos, com capacidade de 53 cm³, utilizando-se vermiculita de granulometria média como substrato, e acondicionadas na casa de vegetação. Após 48 dias do plantio, foram avaliadas as seguintes variáveis: estacas enraizadas; número médio de raízes por estaca; comprimento médio das três maiores raízes; estacas mortas; estacas que permaneceram vivas sem enraizar e formar calo e formação de calo.

O delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado, com três tratamentos, sete repetições e dez estacas por unidade experimental, totalizando 210 estacas. Para análise dos dados, foi empregado o programa estatístico JMP (“Statistical Analysis System” SAS Institute Inc. E.U.A., 1989-2000) versão 4.0, sendo utilizado o teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após 48 dias de cultivo, constatou-se que houve um elevado número de estacas de jasmim-amarelo (*Jasminum mesnyi* Hance) enraizadas, o tratamento testemunha apresentou maior porcentagem de enraizamento (95,7%) com relação a estacas tratadas com 1000 e 2000 mg Kg⁻¹ de AIB, ambos com 90% de enraizamento, sendo os resultados considerados satisfatórios mesmo na ausência de AIB (Tabela 1). O elevado enraizamento na testemunha indica que a espécie não necessita do uso de reguladores vegetais, podendo ser considerada uma espécie de fácil enraizamento (CEZAR *et al.*, 2009).

Semelhantemente, Althaus *et al.* (2004), em experimento com

jasmim-amarelo utilizando ácido naftaleno acético (ANA), outra auxina sintética, obtiveram melhor resultado com a testemunha com 100% de enraizamento, seguido de 97,5% para a concentração de 5000 mgKg⁻¹ de ANA. Resultados similares foram encontrados por Ziantonio *et al.* (2003), os quais verificaram que na ausência de AIB estacas de espinheira-santa apresentaram melhores resultados na porcentagem de enraizamento (66,7%), e por Macanhão *et al.* (2003), em estacas de cipó-de-são-joão, que apresentaram 34,4% de enraizamento.

Em estudos com utilização de AIB em estacas de duas espécies de caliandra (*Calliandra brevipes* e *Calliandra tweedii*), foi verificado que o AIB não influenciou o enraizamento de *C. brevipes*, ao contrário de *C. tweedii*, na qual se elevou a porcentagem de enraizamento em relação à testemunha com a aplicação exógena de 2000 mgL⁻¹ de AIB (MAYER *et al.*, 2008).

Tabela 1 Média das porcentagens de enraizamento, número de raízes por estaca, comprimento das raízes e mortalidade de estacas de jasmim-amarelo (*Jasminum mesnyi* Hance) submetidas ao tratamento com ácido indolbutírico (AIB)

Tratamentos	EE (%) ns	NR ns	CM (cm)	EM (%)	EV (%) ns
0 mg Kg ⁻¹ AIB	95,7	12,3	3,14b	0b	4,3
1000 mg Kg ⁻¹ AIB	90,0	11,1	6,26a	5,7a	4,3
2000 mg Kg ⁻¹ AIB	90,0	10,6	5,60a	4,3a	5,7

ns: não significativo. Médias seguidas por letra diferente na coluna diferem estatisticamente para teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. AIB: ácido indolbutírico; EE: estacas enraizadas; NR: número de raízes por estaca; CM: comprimento médio das três maiores raízes; EM: estacas mortas; EV: estacas vivas que não enraizaram e não formaram calo.

No experimento de estaquia com manacá (*Brunfelsia uniflora* (Pohl.) D. Don.), utilizando aplicação de AIB em talco e em solução, na primeira avaliação, aos 60 dias após a instalação do experimento, não houve diferença significativa para a variável porcentagem de estacas enraizadas, sendo a maior porcentagem de 10,0% para o controle em solução. Na segunda avaliação, 120 dias após instalação, observou-se um aumento na porcentagem de enraizamento (41,94%) para o mesmo tratamento, sendo considerada a aplicação de AIB desnecessária, uma vez que não aumentou a indução de raízes e calos (ALTHAUS-OTTMANN; LEAL; ZUFFELLATO-RIBAS, 2006).

Em testes para verificar o potencial de enraizamento de estacas herbáceas de diferentes cultivares de mirtilo (*Vaccinium* sp.), tratadas com AIB nas concentrações de 0, 2500, 5000 e 7500 mg L⁻¹, foi verificado

que o uso do AIB não proporcionou estímulo na emissão de raízes adventícias (TREVISAN *et al.*, 2008).

De acordo com Paes *et al.* (2006), uma vez que a testemunha enraizou satisfatoriamente sem a adição de auxina exógena, supõe-se que a síntese de IAA endógeno seja alta, fazendo a espécie ser classificada como de fácil enraizamento.

Entretanto, Costa Jr, Scarpore Filho e Bastos (2003) relatam que no enraizamento de goiabeiras a concentração de 2000 mg L⁻¹ de AIB aumentou a porcentagem de enraizamento das cultivares. Para Oliveira, Nienow e Calvete (2003), as porcentagens de enraizamento do pessegueiro obtidas com o uso do AIB são em geral acima de 70%, sendo consideradas satisfatórias. Zuffellato-Ribas e Rodrigues (2001) afirmam que o objetivo de tratar estacas com reguladores vegetais é proporcionar uma maior porcentagem de enraizamento.

Para o número de raízes de estacas de jasmim-amarelo, não foi observada diferença estatística significativa em relação aos diferentes tratamentos. Mesmo assim, o tratamento que proporcionou maior número médio de raízes foi a testemunha, com 12,3 raízes por estaca, seguidos das estacas tratadas com 1000 e 2000 mg Kg⁻¹ de AIB, com 11,1 e 10,6, respectivamente.

A utilização de 10000 mg L⁻¹ de AIB induziu o número de raízes em estacas de jasmim-amarelo, atingindo a média de 19,4 raízes por estacas, ao passo que o controle formou na média 15,1 raízes por estaca (LOPES; JACOB; BETTENCOURT, 2000). Ziantonio *et al.* (2003), em seu trabalho com espinheira-santa, obteve maior número de raízes também na testemunha (cinco raízes por estaca).

Em testes de enraizamento com estacas de guaco (*Mikania glomerata* Spr.), o uso de diferentes concentrações de ANA em talco e em solução (0; 2500; 5000 mg kg⁻¹ e 0; 2500; 5000 mg L⁻¹, respectivamente) apresentou taxa de enraizamento alta (~90%) em todos os tratamentos, destacando-se o tratamento na concentração de 2500 mg kg⁻¹ de ANA em forma de talco para indução de maior número de raízes por estaca (COLODI *et al.*, 2008).

Para a variável comprimento médio das raízes de estacas de jasmim-amarelo, o tratamento com AIB estimulou o comprimento das estacas, sendo 6,26 e 5,60 cm para as tratadas com 1000 e 2000 mg Kg⁻¹ de AIB, respectivamente. O tratamento controle apresentou uma média de comprimento das raízes de 3,14 cm. Observando que a variável comprimento médio das 3 maiores raízes (cm) não apresentou diferença estatisticamente significativa entre as dosagens de auxina, supõe-se que o aumento na concentração de AIB testada neste trabalho não

tenha influência no comprimento das raízes de jasmim-amarelo, podendo sugerir a utilização da dosagem mais baixa (1000 mg Kg⁻¹).

Estacas de jasmim-amarelo tratadas com ANA na concentração de 5000 mg Kg⁻¹ tiveram seu crescimento radicular incrementado quando comparado ao controle (ALTHAUS *et al.*, 2007). O uso de ANA em ramos semi-lenhosos (*Abelia x grandiflora* Hort. ex. L. H. Bailey) não aumentou a taxa de enraizamento comparada ao controle, mas na concentração de 5000 mg Kg⁻¹ também aumentou o número de raízes por estaca e o comprimento das três maiores raízes (PAES *et al.*, 2006).

Bujokas, Cruz-Silva e Zuffellato-Ribas (2003), em trabalho com pingo-de-ouro (*Duranta repens*), não encontraram valores estatísticos diferentes para o comprimento médio das raízes tratadas com AIB. Pimenta, Pinto e Zuffellato-Ribas (2003), trabalhando com hortências, utilizaram AIB e ANA nas estacas; embora não tenham encontrado diferenças estatisticamente significativas, relatam que houve uma diferenciação no uso de AIB, o qual aumentou o comprimento médio das três maiores raízes.

Loner *et al.* (2010) verificaram que não houve contribuição do AIB no enraizamento de estacas herbáceas de azaleia (*Rhododendron simsii* Planch), o qual não influenciou também comprimento médio da raiz, número de folhas por estaca e massa fresca das estacas.

Para a taxa de mortalidade, o tratamento testemunha apresentou resultados superiores aos demais tratamentos, pois foi nulo o número de estacas mortas. Os tratamentos com 1000 e 2000 mg Kg⁻¹ de AIB apresentaram 5,7 e 4,3% de mortalidade, respectivamente, sendo que para propagação vegetativa esses percentuais de mortalidade não são considerados relevantes. Andrade e Martins (2003), analisando a porcentagem de sobrevivência de porta-enxerto para citros, também observaram que para a testemunha o índice de mortalidade foi menor em relação aos demais tratamentos com AIB.

As estacas de jasmim-amarelo não apresentaram formação de calos. Frazon, Antunes e Raseira (2004) observaram uma pequena porcentagem de formação de calos na base das estacas de goiabeira-serrana (*Acca sellowiana* Berg.), de 0 a 5%, sem diferença estatística significativa entre os diferentes tratamentos com AIB e estacas de 12 e 18 cm de comprimento. Segundo Fachinello *et al.* (1995), o calo aparece quando os tecidos do floema e xilema são lesionados, o que resulta em posterior formação de um tecido de cicatrização, constituído por um aglomerado de células desorganizadas, parenquimatosas e em diferentes etapas de lignificação. Hartmann *et al.* (2011) relatam que as raízes aparecem frequentemente após a formação de calos, como

também podem ser processos independentes em função das condições endógenas da estaca e do ambiente no qual se desenvolve. Zuffellato-Ribas e Rodrigues (2001) citam que em vários casos a formação do calo e a formação da raiz são independentes umas das outras, fato confirmado por trabalhos com resultados divergentes.

Como a taxa de enraizamento foi alta, as estacas de jasmim-amarelo apresentaram um baixo percentual de estacas que permaneceram vivas sem enraizar, de 4,3 a 5,7%, não havendo diferença significativa para as estacas tratadas com AIB quando comparadas ao controle (Tabela 1). De forma semelhante, para a porcentagem de estacas vivas não enraizadas de espinheira-santa (*Maytenus ilicifolia* Martius ex Reissek), não houve diferença estatística significativa quando avaliado o enraizamento em diferentes substratos e concentrações de ANA (LIMA *et al.*, 2008).

CONCLUSÕES

Com base nos resultados encontrados no presente trabalho, conclui-se que o jasmim-amarelo é uma espécie que apresenta uma elevada capacidade de enraizamento, com taxas acima de 90% no verão, sem a aplicação de AIB, podendo ser considerada de fácil enraizamento. Entretanto, com o uso de AIB há um aumento no comprimento das raízes.

REFERÊNCIAS

ALTHAUS, M. M.; LEAL, L.; SILVEIRA, F.; ZUFFELLATO-RIBAS, K. C.; RIBAS, L. L. F. Estaquia de Jasmim-amarelo (*Jasminum mesnyi* Hance) utilizando diferentes substratos e ácido naftaleno acético. In: CONGRESSO NACIONAL DE BOTÂNICA E ENCONTRO REGIONAL DE BOTÂNICOS DE MG, BA E ES, 55, 26, 2004. **Anais...** Livro de Resumos Sociedade Botânica do Brasil Universidade Federal de Viçosa, UFV, 2004. CD-ROM, 2004.

ALTHAUS, M. M.; LEAL, L.; SILVEIRA, F.; ZUFFELLATO-RIBAS, K. C.; RIBAS, L. L. F. Influência do ácido naftaleno acético e dois tipos de substrato no enraizamento de estacas de jasmim-amarelo. **Revista Ciência Agronômica**, Fortaleza, v. 38, n. 3, p. 322-326, 2007.

ALTHAUS-OTTMANN, M. M.; LEAL, L.; ZUFFELLATO-RIBAS, K. C. Propagação vegetativa de manacá (*Brunfelsia uniflora* (Pohl.) D. Don).

Revista Brasileira de Horticultura Ornamental, Campinas, v. 12, n. 1, p. 31-36, 2006.

ANDRADE, R. A.; MARTINS, A. B. G. Propagação vegetativa de porta-enxertos para citros. **Revista Brasileira de Fruticultura**, Jaboticabal, v. 25, n. 1, p. 134-136, 2003.

BUJOKAS, W. M.; CRUZ-SILVA, C. T. A.; ZUFFELLATO-RIBAS, K. C. Propagação vegetativa de *Duranta repens* L. via estaquia pela aplicação de auxinas sintéticas. **Cultura Agrônômica**, Ilha Solteira, v. 12, n. 1, p. 117-124, 2003.

CEZAR, T. M.; SOUZA, F. C.; MACIEL, R. T.; DEMBISKI, W.; ZUFFELLATO-RIBAS, K. C.; RIBAS, L. L. F.; KOEHLER, H. S. Estaquia e alporquia de *Tibouchina fothergillae* (D.C.) Cogn. (Melastomataceae) com a aplicação de ácido naftaleno Acético. **Scientia Agraria**, Curitiba, v. 10, n. 6, p. 463-468, 2009.

COLODI, F. G.; RAMOS, N. L. C.; ZUFFELLATO-RIBAS, K. C.; RIBAS, L. L. F.; KOEHLER, H. S. Propagação vegetativa de guaco com adição de ácido naftalenoacético. **Scientia Agraria**, Curitiba, v. 9, n. 1, p. 95-98, 2008.

COSTA JR., W. H.; SCARPARE FILHO, J. A.; BASTOS, D. C. Estiolamento da planta matriz e uso de ácido indolbutírico no enraizamento de estacas de goiabeiras. **Revista Brasileira Fruticultura**, Jaboticabal, v. 25, n. 2, p. 301-304, 2003.

FACHINELLO, J. C.; HOFFMAN, A.; NACHTIGAL, J. C.; KERSTEN, E.; FORTES, G. R. **Propagação de plantas frutíferas de clima temperado**. 2. ed. Pelotas: UFPEL, 1995.

FONSECA, C. E. L.; SPERANDIO, J. P.; CORREA, M. P. F.; BUENO, D. M.; LIMA, R. Propagação vegetativa do Jacarandá-da-Baía através da estaquia. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, Brasília, v. 26, n. 1, p. 31-37, 1991.

FRAZON, R. C.; ANTUNES, L. E. C.; RASEIRA, M. C. B. Efeito do AIB e de diferentes tipos de estaca na propagação vegetativa da goiabeira-serrana (*Acca sellowiana* Berg). **Revista Brasileira de Agrociência**, Pelotas, v. 10, n. 4, p. 515-518, 2004.

HARTMANN, H. T.; KESTER, D. E.; DAVIES JR, R. T.; GENEVE, R. L. **Plant Propagation: principles and practices**. 8. ed. New Jersey: Prentice Hall, 2011.

JARVIS, B. C.; ALI, A. H. N.; SHAHEED, A. I. Auxin and boron in relation to the rooting response and ageing of mung bean cuttings. **New phytologist**, Cambridge, v. 95, p. 509-518, 1983.

LIMA, D. M.; SILVA, C. L.; RITTER, M.; BIASI, L. A.; ZANETTE, F.; ZUFFELLATO-RIBAS, K. C. Substratos e auxinas no enraizamento de estacas caulinares de espinheira-santa. **Scientia Agraria**, Curitiba, v. 9, n. 1, p. 85-89, 2008.

LONER, A. B.; UNEMOTO, L. K.; YAMAMOTO, L. Y.; COSTA, L.; SCHNITZER, J. A.; SATO, A. J.; RICCE, W. S.; ASSIS, A. M.; ROBERTO, S. R. Enraizamento de estacas de azaleia (*Rhododendron simsii* Planch.) no outono em AIB e diferentes substratos. **Ciência Rural**, Santa Maria, v. 40, n. 8, p. 1720-1725, 2010.

LOPES, M. F.; JACOB, A. P.; BETTENCOURT, J. M. Estudos para a propagação vegetativa de algumas ornamentais de exterior. In: ENCONTRO NACIONAL DE PLANTAS ORNAMENTAIS, 3, 2000. Lisboa: Associação Portuguesa de Horticultura, 2000. p. 173-177.

LORENZI, H.; SOUZA, H. M. **Plantas ornamentais no Brasil**: arbustivas, herbáceas e trepadeiras. 3. ed. Nova Odessa: Instituto Plantarum, 1999.

MACANHÃO, P.; ZUFFELLATO-RIBAS, K. C.; CARPANEZZI, A. A.; TAVARES, F. R. Enraizamento do cipó-de-são-joão (*Pyrostegia venusta*) pela aplicação de IBA e NAA. **Brazilian Journal of Plant Physiology**, Campinas, v. 15, supl., p. 132, 2003. Edição de Resumos do Congresso Brasileiro de Fisiologia Vegetal, 9, 2003. Atibaia, SP.

MAYER, J. L. S.; CARDOSO, N. A.; CUQUEL, F.; BONA, C. Formação de raízes em estacas de duas espécies de *Calliandra* (Leguminosae - Mimosoideae). **Rodriguésia**, Rio de Janeiro, v. 59, n. 3, p. 487-495, 2008.

NASS, L. L.; VALOIS, A. C. C.; MELO, I. S.; VALADARES-INGLIS, M. C. **Recursos genéticos e melhoramento Plantas**. Rondonópolis: Fundação MT, 2001.

OLIVEIRA, A. P.; NIENOW, A. A.; CALVETE, E. O. Capacidade de enraizamento de estacas semilenhosas e lenhosas de cultivares de pessegueiro tratadas com AIB. **Revista Brasileira de Fruticultura**, Jaboticabal, v. 25, n. 2, p. 282-285, 2003.

ONO, E. O.; RODRIGUES, J. D.; PINHO, S. Z. Ação de auxinas e/ou boro, no processo de formação de raízes em estacas de café (*Coffea arabica* L. CV. “Mundo Novo”). **Arquivos Biologia e Tecnologia**, Curitiba, v. 37, n. 1, p. 157-166, 1994.

ONO, E. O.; BARROS, S. A.; RODRIGUES, J. D.; PINHO, S. Z. Enraizamento de estacas de *Platanus acerifolia* tratadas com auxinas. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, Brasília, v. 29, n. 9, p. 1373-1380, 1994.

ONO, E. O.; RODRIGUES, J. D.; PINHO, S. Z. Efeito de auxinas e boro no enraizamento de estacas caulinares de kiwi retiradas em diferentes épocas. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, Brasília, v. 33, n. 2, p. 213-219, 1998.

PAES, E. G. B.; HÖGER FILHO, G.; ZUFFELLATO-RIBAS, K. C.; BRITO, F. P. Estaquia de *Abelia x grandiflora* Hort. Ex L. H. Bailey. **Cultura agrônômica**, Ilha Solteira, v. 15, n. 1, p. 26-36, 2006.

PIMENTA, A. C.; PINTO, L. S.; ZUFFELLATO-RIBAS, K. C. Enraizamento de hortênsia pela aplicação de auxinas comerciais. **Cultura Agrônômica**, Ilha Solteira, v. 12, n. 1, p. 1-8, 2003.

STUMPF, E. R. T.; GROLLI, P. R.; SCZEPANSKI, P. H. G. Efeito do ácido indolbutírico, substrato e tipo de estaca no enraizamento de *Chamaecyparis lawsoniana* PARL. **Revista Brasileira de Agrociência**, Pelotas, v. 7, n. 2, p. 101-105, 2001.

TREVISAN, R.; FRANZON, R. C.; NETO, R. F.; GONCALVES, R. S.; GONCALVES, E. D.; ANTUNES, L. E. C. Enraizamento de estacas herbáceas de mirtilo: influência da lesão na base e do ácido indolbutírico. **Ciência e Agrotecnologia**, Lavras, v. 32, n. 2, p. 402-406, 2008.

ZIANTONIO, V. L. F.; LIMA, J. G.; ZUFFELLATO-RIBAS, K. C.; RIBAS, L. L. F. Propagação vegetativa de *Maytenus ilicifolia* Mart. Utilizando diferentes concentrações de ácido indol butírico (IBA). **Brazilian Journal of Plant Physiology**, Campinas, v. 15, supl., p. 139, 2003. Edição de Resumos do Congresso Brasileiro de Fisiologia Vegetal, 9, 2003. Atibaia, SP.

ZUFFELLATO-RIBAS, K. C.; RODRIGUES, J. D. **Estaquia**: uma abordagem dos principais aspectos fisiológicos. Curitiba, 2001.